

核准日期：2007年01月30日
修改日期：2010年03月23日
修改日期：2010年12月06日
修改日期：2014年04月16日
修改日期：2015年12月01日
修改日期：2020年10月29日
修改日期：2021年07月09日
修改日期：2023年04月13日

盐酸昂丹司琼片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】


通用名称：盐酸昂丹司琼片

英文名称：Ondansetron Hydrochloride Tablets

【成分】

本品主要成份为盐酸昂丹司琼。

化学名称：2,3,4-二氧-5-
化学结构式：



性药物化疗和放射治疗引起的恶心呕吐；2.预防和手术治疗后的恶心呕吐。

引起的呕吐：化疗前15分钟、化疗后4小时、8小时各静脉注射昂丹司琼注射液8mg，停止化疗以
5mg（2片），连用5天。

疗药引起的呕吐：化疗前15分钟静脉注射昂丹司琼注射液8mg，以后每8~12小时口服昂丹司琼片

吐：首剂须于放疗前1~2小时口服片剂8mg（2片），以后每8小时口服8mg（2片），疗程视放疗

呕吐：在麻醉前1小时口服片剂8mg（2片），随后每隔8小时口服片剂8mg（2片）两次。

秘、口干、皮疹、偶见支气管哮喘或过敏反应、短暂性无症状转氨酶增加。上述反应轻微，无须特
、并有胸痛、心律不齐、低血压及心动过缓的罕见报告。

啡联合用药时有严重低血压和意识丧失的报道，故本品禁止与阿扑啡联合使用。

本品为处方药，请在医生指导下使用。

在临床试验中观察到昂丹司琼片对某些患者可能引起心电图QTc间期延长，因此，昂丹司

片，应在医生的指导下使用。

3. 昂丹司琼片为处方药，上市前已有接受昂丹司琼片治疗的患者发生心律失常的报道，个别病例
在患者接受昂丹司琼片治疗期间可能出现QTc间期延长的患者应接受昂丹司琼片治疗前应接受心电图

分子式： $C_{15}H_{15}N_3O_2 \cdot HCl_2$
分子量：355.85

【性状】

本品为白色或类白色片。

【适应症】

止吐药。用于：1.细胞毒

【规格】

4mg（以 $C_{15}H_{15}N_3O_2$ 计）

【用法用量】

1.对于高度催吐的化疗药
后每8~12小时口服昂丹司琼片

2.对催吐程度不太强的化
8mg（2片），连用5天。

3.对于放射治疗引起的呕
的疗程而定。

4.对于预防手术后的恶心

【不良反应】

可有头痛、腹部不适、便
殊处理。个别患者有癫痫发作。

【禁忌】

由于昂丹司琼与盐酸阿扑

啡联合用药，可能导致

【注意事项】

1.昂丹司琼片为处方药，应在
2.昂丹司琼片为处方药，应在

3.昂丹司琼片为处方药，应在

4.昂丹司琼片为处方药，应在

5.昂丹司琼片为处方药，应在

6.昂丹司琼片为处方药，应在

